Algoritmo de RCP para perros y gatos

RECOVER

Iniciar BLS

2 minutos completos, sin pausas

1. **Compresiones torácicas**
   100-120 / minuto
2. **Ventilación**
   cada 6 segundos

Iniciar ALS

3. **Monitoreo**
   ECG
   $ETCO_2$ 18+ mmHg
4. **Acceso venoso**
5. **Reversores**

Pausa y evaluar

< 10 segundos

Diagnóstico del ritmo | Palpación del pulso

Sin pulso

Desfibrilable
FV / TV sin pulso

BLS

Cargar desfibrilador
duplicar dosis después de la 1ª

Pausa y Descargar

Refractario Desfibrilable
2 o más descargas

Sugerir

Vasopresina o Epinefrina
cada dos ciclos

Antiarrítmicos
Amiodarona en gatos
Lidocaína en perros

Esmolol

Pulso

RCE

Algoritmo PPC

Sin pulso

No desfibrilable
Asistolia / AEP

Epinefrina o Vasopresina
cada dos ciclos

Sugerir

Atropina
una vez, lo antes posible

RCP prolongada > 15 min

Desfibrilable o No desfibrilable

Sugerir

Bicarbonato
especialmente si el pH < 7.0

© 2024 The RECOVER Initiative. Todos los derechos reservados.