Algoritmo di rianimazione cardiopolmonare (RCP) per cani e gatti

RECOVER

Inizia il BLS

per 2 minuti, senza pause

1. **Compressioni toraciche**
   100-120 / minuto
2. **Ventila**
   ogni 6 secondi

Inizia l'ALS

3. **Monitoraggi**
   ECG
   $ETCO_2$ >18 mm Hg
4. **Accesso venoso**
5. **Antagonisti**

Pausa e Controlla

< 10 secondi

Valuta il ritmo

Palpa il polso

Polso assente

Defibrillabile
FV / TV senza polso

BLS

Carica il defibrillatore
raddoppia la dose
dopo la prima scarica

Pausa e Scarica

Ritmo Defibrillabile Refrattario
2 o più scariche

Considera

Vasopressina o Adrenalina
a cicli alterni

Antiaritmici
Amiodarone nei gatti
Lidocaina nei cani

Esmololo

Polso presente

ROSC

Algoritmo del PCA

Polso assente

Non defibrillabile
Asistolia / PEA

Adrenalina
o vasopressina
a cicli alterni

Considera

Atropina
una volta, il prima possibile

RCP prolungata > 15 min

Defibrillabile o
Non defibrillabile

Considera

Bicarbonato
soprattutto se il pH < 7,0

© 2024 The RECOVER Initiative. Tutti i diritti riservati.