Algoritma CPR untuk Anjing dan Kucing

RECOVER

Mulakan BLS

2 minit penuh, tanpa henti

1. **Tekanan Dada**
   100-120 / minit
2. **Ventilasi**
   setiap 6 saat

Mulakan ALS

3. **Pemantauan**
   ECG
   $ETCO_2$ 18+ mmHg
4. **Akses IV**
5. **Agen Pembalikan**

Berhenti Sebentar & Semak

< 10 saat

Diagnosis Ritma

Periksa Denyutan Nadi

Tiada Denyutan Nadi

Boleh Direnjat
VF / VT Tanpa Nadi

BLS

Caj Defib
dos x2 selepas cubaan pertama

Berhenti Sebentar & Renjat

Boleh Direnjat, Refraktori
2 atau lebih renjatan

Cadangan

Vasopressin atau *Epinephrine*
selang setiap kitaran

Antiaritmik
Amiodarone bagi kucing
Lidocaine bagi anjing

Esmolol

Nadi

ROSC

Algoritma PCA

Tiada Denyutan Nadi

Tidak Boleh Direnjat
Asystole / PEA

Epinephrine atau *Vasopressin*
selang setiap kitaran

Cadangan

Atropine
sekali, seawal mungkin

CPR Berpanjangan > 15 min

Boleh Direnjat atau Tidak Boleh Direnjat

Cadangan

Bicarbonate
terutamanya jika pH <7.0

© 2024 The RECOVER Initiative. Semua hak cipta terpelihara.