Algorytm RKO dla psów i kotów

RECOVER

Rozpocznij BLS

2 pełne minuty, bez przerw

1. **Uciski klatki piersiowej**
   100-120 / minutę
2. **Oddech zastępczy**
   co 6 sekund

Rozpocznij ALS

3. **Monitoruj**
   EKG
   $ETCO_2$ 18≥ mmHg
4. **Dostęp dożylny**
5. **Środki odwracające**

Lorem ipsum

Przerwij i oceń
< 10 sekund

Oceń rytm

Sprawdź tętno

Brak tętna

Do defibrylacji
VF / VT bez tętna

BLS

Naładuj defibrylator
podwój dawkę po pierwszym wyładowaniu

Przerwij masaż serca i wyładuj

Oporny na defibrylacje
2 lub więcej wyładowań

Sugerowane terapie

Wazopresyna lub adrenalina
co drugi cykl

Leki antyarytmiczne
Amiodaron u kotów
Lidokaina u psów

Esmolol

Tętno

ROSC

Algorytm poresuscytacyjny (PCA)

Brak tętna

Nie do defibrylacji
Asystolia / PEA

Adrenalina lub wazopresyna
co drugi cykl

Sugerowane terapie

Atropina
raz, jak najwcześniej

Długotrwałe RKO > 15 min

Do defibrylacji
Nie do defibrylacji

Sugerowane terapie

Wodorowęglan sodu
szczególnie gdy pH < 7,0

© 2024 The RECOVER Initiative. Wszelkie prawa zastrzeżone.