Алгоритм СЛР для собак и кошек

RECOVER

Начните базовую СЛР

2 минуты, без пауз

1. **Компрессии грудной клетки**
   100-120 в минуту
2. **Вентиляция**
   каждые 6 секунд

Начните расширенную СЛР

3. **Мониторинг**
   ЭКГ
   $ETCO_2$ 18+ мм рт. ст.
4. **В/в доступ**
5. **Реверсирующие агенты**

Пауза и проверка
< 10 секунд

Оценка ритма

Пальпация пульса

Нет пульса

Разряд требуется
ФЖ/ЖТбП

БРМ

Заряжайте деф
доза x2 после 1-го разряда

Пауза и Разряд

Рефрактерный ритм, подлежащий дефибрилляции
2 или более разрядов дефибриллятора

Рассмотрите

Вазопрессин или адреналин
каждый второй цикл

Антиаритмики
Амиодарон - кошки
Лидокаин - собаки

Эсмолол

Пульс

ВСК

Алгоритм пост-СЛР лечения

Нет пульса

Разряд НЕ требуется
Асистолия/ЭАбП

Адреналин или Вазопрессин
каждый второй цикл

Рассмотрите

Атропин
однократно, как можно раньше

Продленная СЛР > 15 мин

подлежащий или не подлежащий дефибрилляции

Рассмотрите

Бикарбонат
особенно если pH < 7,0

© 2024 The RECOVER Initiative. Все права защищены.