Algoritmo de RCP para Perros y Gatos

RECOVER

Iniciar SVB

2 minutos completos, sin pausas

1. **Compresiones torácicas**
   100-120 / minuto
2. **Ventilación**
   cada 6 segundos

Inicio SVA

3. **Monitorización**
   ECG
   $ETCO_2$ 18+ mmHg
4. **Acceso intravenoso**
5. **Antagonistas**

Pausa y Comprobación

< 10 segundos

Diagnóstico del ritmo | Palpación del pulso

Sin pulso

Desfibrilable
FV / TVSP

SVB

Cargar desfibrilador
dosis x2
después de la 1ª

Pausa y Descarga

Pulso

RCE

Algoritmo post-PCR

Sin pulso

No desfibrilable
Asistolia / AESP

Adrenalina/Epinefrina o Vasopresina
cada dos ciclos

Sugerir
Atropina
una vez, lo antes posible

Ritmo desfibrilable refractario

2 o más desfibrilaciones

Sugerir

Vasopresina o Adrenalina/Epinefrina
cada dos ciclos

Antiarrítmicos
Amiodarona en gatos
Lidocaína en perros

Esmolol

RCP prolongada > 15 min

Desfibrilable o
No desfibrilable

Sugerir
Bicarbonato
especialmente si pH < 7.0

© 2024 The RECOVER Initiative. Todos los derechos reservados.