Algoritmo de RCP para cães e gatos

RECOVER

Iniciar SBV

2 minutos completos, sem pausas

1. **Compressões torácicas**
   100-120 / minuto
2. **Ventilação**
   a cada 6 segundos

Iniciar SAV

3. **Monitorização**
   ECG
   $ETCO_2$ 18+ mmHg
4. **Acesso IV**
5. **Antagonistas**

Pause e Verifique o Pulso

< 10 segundos

Diagnóstico do ritmo cardíaco

Palpação do pulso

Sem pulso

Ritmo desfibrilável
FV / TV sem pulso

SBV

Carregue o Desfibrilador
x2 a energia inicial após 1º choque

Pause e Choque

Ritmo desfibrilável Refratário
2 ou mais choques

Sugerir

Vasopressina ou Adrenalina (epinefrina)
em ciclos alternados

Antiarrítmicos
Amiodarona em gatos
Lidocaína em cães

Esmolol

Com pulsação

RCE

Algoritmo PCR

Sem pulso

Não desfibrilável
Assistolia / AESP

Adrenalina (epinefrina) ou Vasopressina
em ciclos alternados

Sugerir

Atropina
uma vez apenas, o mais cedo possível

RCP prolongada > 15 min

Desfibrilável ou Não Refratário

Sugerir

Bicarbonato
especialmente se o pH for < 7,0

© 2024 The RECOVER Initiative. Todos os direitos reservados.