Algoritmo de RCP para cães e gatos

RECOVER

Iniciar SBV

2 minutos completos, sem pausas

1. **Compressões torácicas**
   100-120 / minuto
2. **Ventilação**
   a cada 6 segundos

Iniciar SAV

3. **Monitorização**
   ECG
   $ETCO_2$ 18+ mmHg
4. **Acesso IV**
5. **Antagonistas**

Pausa & Verificação do pulso

< 10 segundos

Diagnóstico do ritmo cardíaco

Palpação do pulso

Sem pulso

Ritmo Desfibrilhável
FV / TV sem pulso

SBV

Carregar o desfibrilhador
x2 a energia inicial após 1º choque

Pausa & Choque

Ritmo desfibrilhável
2 ou mais choques

Sugerir

Vasopressina ou Adrenalina (epinefrina)
em ciclos alternados

Antiarrítmicos
Amiodarona em gatos
Lidocaína em cães

Esmolol

Com pulso

RCE

Algoritmo PCR

Sem pulso

Ritmo não desfibrilhável
Assistolia / AEsp

Adrenalina (epinefrina) ou Vasopressina
em ciclos alternados

Sugerir

Atropina
uma vez apenas, o mais cedo possível

RCP prolongada > 15 min

Desfibrilhável ou Não desfibrilhável

Sugerir

Bicarbonato
especialmente se o pH for < 7,0

© 2024 The RECOVER Initiative. Todos os direitos reservados.