



# Tabella di dosaggio dei farmaci nella RCP nel cane e gatto **RECOVER**



		Peso (kg)	2,5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
<b>FARMACO</b>		<b>DOSE</b>	ml	ml	ml	ml	ml	ml	ml	ml	ml	ml	ml
<b>Arresto</b>	<b>Adrenalina</b> (1:1000; 1mg/mL)	<b>0,01 mg/kg</b>	0,03	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5
	<b>Vasopressina</b> (20 U/mL)	<b>0,8 U/kg</b>	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2
	<b>Atropina</b> (1 mg/mL)	<b>~ 0,04 mg/kg</b>	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2
<b>Anti-Aritmico</b>	<b>Amiodarone</b> (50 mg/mL)	<b>5 mg/kg</b>	0,25	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
	<b>Lidocaina</b> (20 mg/mL)	<b>2 mg/kg</b>	0,25	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
	<b>Esmolol*</b> (10 mg/mL)	<b>0,5 mg/kg</b>	0,13	0,25	0,5	0,75	1	1,3	1,5	1,8	2	2,3	2,5
<b>Antagonisti</b>	<b>Naloxone</b> (0,4 mg/mL)	<b>0,04 mg/kg</b>	0,25	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
	<b>Flumazenil</b> (0,1 mg/mL)	<b>0,01mg/kg</b>	0,25	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
	<b>Atipamezolo</b> (5 mg/mL)	<b>100 µg/kg</b>	0,06	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
<b>Defibrillazione monofasica</b>	<b>Defibrillatore esterno</b> (J)	<b>4 - 6 J/kg</b>	10 J	20 J	40 J	60 J	80 J	100 J	120 J	140 J	160 J	180 J	200 J
	<b>Defibrillatore interno</b> (J)	<b>0,5 - 1 J/kg</b>	2 J	3 J	5 J	8 J	10 J	15 J	15 J	20 J	20 J	20 J	25 J
		Peso (kg)	2,5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50

\*Somministrare esmololo 0,5 mg/kg per via intraossea o per via intraossea nell'arco di 3-5 minuti, seguito da una CRI a 50 mcg/kg/min.

# Tabella di dosaggio dei farmaci nella RCP nel cane e gatto **RECOVER**



		Peso (kg)	2,5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
<b>FARMACO</b>		<b>DOSE</b>	ml	ml	ml	ml	ml	ml	ml	ml	ml	ml	ml
<b>Arresto</b>	<b>Adrenalina</b> (1:1000; 1mg/mL)	<b>0,01 mg/kg</b>	0,03	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5
	<b>Vasopressina</b> (20 U/mL)	<b>0,8 U/kg</b>	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2
	<b>Atropina</b> (1 mg/mL)	<b>~ 0,04 mg/kg</b>	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2
<b>Anti-Aritmico</b>	<b>Amiodarone</b> (50 mg/mL)	<b>5 mg/kg</b>	0,25	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
	<b>Lidocaina</b> (20 mg/mL)	<b>2 mg/kg</b>	0,25	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
	<b>Esmolol*</b> (10 mg/mL)	<b>0,5 mg/kg</b>	0,13	0,25	0,5	0,75	1	1,3	1,5	1,8	2	2,3	2,5
<b>Antagonisti</b>	<b>Naloxone</b> (0,4 mg/mL)	<b>0,04 mg/kg</b>	0,25	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
	<b>Flumazenil</b> (0,1 mg/mL)	<b>0,01mg/kg</b>	0,25	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
	<b>Atipamezolo</b> (5 mg/mL)	<b>100 µg/kg</b>	0,06	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
<b>Defibrillazione bifasica</b>	<b>Defibrillatore esterno</b> (J)	<b>2 - 4 J/kg</b>	5 J	10 J	20 J	30 J	40 J	50 J	60 J	70 J	80 J	90 J	100 J
	<b>Defibrillatore interno</b> (J)	<b>0,2 - 0,4 J/kg</b>	1 J	2 J	2 J	3 J	4 J	5 J	6 J	7 J	8 J	9 J	10 J
		Peso (kg)	2,5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50

\*Somministrare esmololo 0,5 mg/kg per via intraossea o per via intraossea nell'arco di 3-5 minuti, seguito da una CRI a 50 mcg/kg/min.