



Tabela dawkowania podczas RKO dla psów i kotów



		Waga (kg)	2,5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
LEK		DAWKA	mL	mL	mL	mL	mL	mL	mL	mL	mL	mL	mL
Zatrzymanie akcji serca	Adrenalina (1:1000; 1 mg/mL)	0,01 mg/kg	0,03	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5
	Wazopresyna (20 U/mL)	0,8 U/kg	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2
	Atropina (0,4 - 0,54 mg/mL)	~ 0,05 mg/kg	0,25	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
Leki antyarytmiczne	Amiodaron (50 mg/mL)	5 mg/kg	0,25	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
	Lidokaina (20 mg/mL)	2 mg/kg	0,25	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
	Esmolol* (10 mg/mL)	0,5 mg/kg	0,13	0,25	0,5	0,75	1	1,3	1,5	1,8	2	2,3	2,5
Leki odwracające	Nalokson (0,4 mg/mL)	0,04 mg/kg	0,25	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
	Flumazenil (0,1 mg/mL)	0,01 mg/kg	0,25	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
	Atipamezol (5 mg/mL)	100 µg/kg	0,06	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
Defibrylacja Jednofazowa	Defibrylacja zewnętrzna (J)	4 - 6 J/kg	10 J	20 J	40 J	60 J	80 J	100 J	120 J	140 J	160 J	180 J	200 J
	Defibrylacja wewnętrzna (J)	0,5 - 1 J/kg	2 J	3 J	5 J	8 J	10 J	15 J	15 J	20 J	20 J	20 J	25 J
		Waga (kg)	2,5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50

*Podawać esmolol 0,5 mg/kg dożylnie lub doszypikowo przez 3-5 minut, a następnie wlew ciągły w dawce 50 mcg/kg/min

Tabela dawkowania podczas RKO dla psów i kotów



		Waga (kg)	2,5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
LEK		DAWKA	mL	mL	mL	mL	mL	mL	mL	mL	mL	mL	mL
Zatrzymanie akcji serca	Adrenalina (1:1000; 1 mg/mL)	0,01 mg/kg	0,03	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5
	Wazopresyna (20 U/mL)	0,8 U/kg	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2
	Atropina (0,4 - 0,54 mg/mL)	~ 0,05 mg/kg	0,25	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
Leki antyarytmiczne	Amiodaron (50 mg/mL)	5 mg/kg	0,25	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
	Lidokaina (20 mg/mL)	2 mg/kg	0,25	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
	Esmolol* (10 mg/mL)	0,5 mg/kg	0,13	0,25	0,5	0,75	1	1,3	1,5	1,8	2	2,3	2,5
Leki odwracające	Nalokson (0,4 mg/mL)	0,04 mg/kg	0,25	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
	Flumazenil (0,1 mg/mL)	0,01 mg/kg	0,25	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
	Atipamezol (5 mg/mL)	100 µg/kg	0,06	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
Defibrylacja Dwufazowa	Defibrylacja zewnętrzna (J)	2 - 4 J/kg	5 J	10 J	20 J	30 J	40 J	50 J	60 J	70 J	80 J	90 J	100 J
	Defibrylacja wewnętrzna (J)	0,2 - 0,4 J/kg	1 J	2 J	2 J	3 J	4 J	5 J	6 J	7 J	8 J	9 J	10 J
		Waga (kg)	2,5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50

*Podawać esmolol 0,5 mg/kg dożylnie lub doszypikowo przez 3-5 minut, a następnie wlew ciągły w dawce 50 mcg/kg/min